

Tipe Koleksi: UHAMKA - Skripsi FIKES

Faktor-faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Pencegahan Penularan TB pada pada pasien TB diwilayah Puskesmas Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Tahun 2016

Yuli Marya Handayani

Deskripsi Lengkap: <http://lib.uhamka.ac.id/detail.jsp?id=74304&lokasi=lokal>

Abstrak

Tuberkulosis adalah penyakit yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium Tuberculosis. Perilaku pasien TB yang patuh terhadap pengobatan yang tepat dapat mencegah penularan pada orang lain. Perilaku masyarakat yang kurang baik akan memperluas penyebaran TB di suatu wilayah. Adapun faktor yang berhubungan dengan perilaku pencegahan adalah pengetahuan, jenis kelamin, tipe pasien TB, dan sikap. Untuk itu permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah faktor ? faktor yang berhubungan dengan perilaku pasien TB terhadap pencegahan dan penularan TB. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Pencegahan Penularan TB Paru pada pasien TB Paru di Wilayah Puskesmas Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Tahun 2016. Dalam penelitian ini, metodologi yang digunakan adalah penelitian analitik dengan pendekatan cross sectional. Pengumpulan data dilakukan secara wawancara dan observasi, dengan sampel penelitian adalah pasien TB Paru rawat jalan di Puskesmas Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proporsi pasien yang memiliki perilaku pencegahan penularan TB Paru rawat jalan ialah kurang baik sebesar 60% dan ada hubungan yang bermakna antara jenis kelamin (P value 0,013), Sikap (Pvalue 0,049) dan Pengetahuan (Pvalue 0,000) terhadap perilaku pencegahan penullaran TB Paru. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi semua pihak, terutama untuk pasien TB Paru agar dapat meningkatkan pemahaman dan wawasan terhadap penyakit TB Paru dan pencegahan penularannya serta menjadi bahan masukan untuk meningkatkan program-program pencegahan dan tatalaksana terkait penyakit TB Paru dan pencegahan penularannya diwaktu yang akan datang. Diharapkan bagi pasien agar bersikap dan berperilaku lebih baik lagi untuk pencegahan penularan TB Paru ke orang lain. Seperti halnya mempunyai kain atau masker penutup mulut yang selalu digunakan, mempunyai tempat penampung dahak pribadi, dan mempunyai alat makan sendiri.